

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 20-5-70 069002

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "CENTRE" (Tél. 87-45-41)

(CHER, INDRE, LOIRET, LOIR-ET-CHER, INDRE-ET-LOIRE, EURE-ET-LOIR)

Sous-Régie de la Protection des Végétaux, 21, rue Eugène-Vignat - ORLÉANS
C. C. P. : ORLÉANS 4.604-25

ABONNEMENT ANNUEL
25 Francs

Supplément N° 2 au Bulletin N° 116

15 MAI 1970

- 12 -

AVERTISSEMENTS -

TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER

ARBRES FRUITIERS

Le développement important de la végétation et dans certaines situations les pluies orageuses parfois abondantes ont diminué considérablement l'efficacité de la dernière application.

Les projections d'ascospores continuent. Enfin, les premières taches sont apparues dans les vergers insuffisamment protégés et d'autres sont à prévoir dans les prochains jours.

Nous rappelons donc les indications données dans notre Bulletin du 5 Mai. La protection des arbres doit toujours être parfaite et il sera nécessaire de renouveler le traitement dans tous les cas où le développement de la végétation et les pluies abondantes auront diminué son efficacité.

Dans tous les vergers qui ont été traités, au début de la semaine, conformément aux indications données dans notre Bulletin du 5 Mai, un nouveau traitement sera nécessaire dans le milieu de la semaine du 18 au 24 Mai.

BLACK-ROT DE LA VIGNE

VIGNES

Les projections d'ascospores continuent. Nous rappelons les indications données dans notre Bulletin du 5 Mai. Un premier traitement devait être effectué dès que les vignes arrivaient au stade sensible d'une feuille étalée (stade E). Une nouvelle application sera nécessaire pour protéger les nouvelles feuilles qui sont apparues depuis le premier traitement.

Nous rappelons que les hybrides producteurs directs peuvent être contaminés et que la lutte est obligatoire dans les communes des départements du Cher, de l'Indre et de Loir-et-Cher contaminées et définies par des arrêtés préfectoraux.

INFORMATIONS -

OIDIUM DU POMMIER

ARBRES FRUITIERS

Il y a lieu de poursuivre la lutte en effectuant un nouveau traitement qui pourra être conjugué avec celui dirigé contre la Tavelure.

ARAIGNEES ROUGES

Les températures élevées de ces derniers jours ont favorisé les éclosions des oeufs d'hiver. Elles vont bientôt se terminer.

En conséquence, dans tous les vergers où la présence d'Araignées rouges a été constatée il y a lieu d'intervenir maintenant en utilisant un des produits conseillés dans la liste qui a été remise à chaque abonné.

ARAIGNEES ROUGES

VIGNES

Les conditions climatiques de ces derniers jours ont favorisé une éclosion très rapide des oeufs d'hiver d'Araignées rouges.

En conséquence, il est conseillé de surveiller attentivement les vignes où l'on redoute les attaques de ces ravageurs afin d'intervenir rapidement, le cas échéant, en utilisant un des produits conseillés dans la liste qui a été remise à chaque abonné.

.../...

ROT-BRENNER

Dans toutes les régions où l'on redoute cette maladie il est conseillé d'effectuer un traitement sur toutes les vignes ayant au moins 2 à 3 feuilles étalées en utilisant un produit à base de CUIVRE, de MANEBE, de MANCOZEBE ou un mélange ZINEBE-CUIVRE, aux doses préconisées contre le Mildiou de la Vigne.

MILDIOU DE LA VIGNE

Les dernières pluies peuvent avoir provoqué les premières contaminations dans les situations et sur les cépages les plus précoces.

Il y a donc lieu de surveiller les vignes et de signaler les premières manifestations de la maladie dans le cadre du concours pour la détection des foyers primaires de Mildiou.

ACARIOSE DE LA VIGNE

Cette affection se rencontre dans quelques vignobles, toutefois, son identification reste toujours délicate. Le soufre en poudrage donne des résultats contre cette affection en présentant l'avantage d'être également efficace contre l'Oïdium et l'Eri-nose.

ERINOSE DE LA VIGNE

Les premières manifestations de cette affection sont visibles dans certaines vignes. Lorsque les attaques sont importantes on peut craindre un dessèchement des jeunes grappes. Les soufrages sont efficaces contre l'Eri-nose et présentent l'avantage d'avoir une action contre l'Oïdium.

PEGOMYIE OU MOUCHE DE LA BETTERAVE

BETTERAVES

Des pontes parfois très nombreuses ont été observées dans certaines cultures. L'importance de l'infestation est variable suivant l'exposition et les cultures.

Les dégâts risquent d'être d'autant plus importants que les betteraves sont jeunes. Seul un examen attentif permettra de juger de l'opportunité d'un traitement. Celui-ci ne devra intervenir que lorsque les premières pontes seront écloses. On pourra utiliser un des produits conseillés dans la liste qui a été remise à chaque abonné.

CULTURES LEGUMIERES

CRIOCERES DE L'ASPERGE

De nombreuses pontes ont déjà été déposées. Les premières éclosions devraient avoir lieu au cours des prochains jours. Il est donc nécessaire de surveiller attentivement les cultures afin d'intervenir, le cas échéant, en utilisant une des matières actives suivantes :

En pulvérisation : LINDANE (20 g de matière active à l'hectolitre), D.D.T. (100 g M.A./hl), PARATHIONS (30 g M.A./hl).

En poudrage : LINDANE (350 g M.A./ha), D.D.T. (1500 g M.A./ha), PARATHIONS (350 g M.A./ha).

Les Contrôleurs chargés des Avertissements
Agricoles ,

L'Inspecteur de la Protection des
Végétaux,

G. RIBAUT
B. PACQUETEAU

G. BENAS

CONCOURS POUR LA DETECTION DES FOYERS PRIMAIRES

DE MILDIOU DE LA VIGNE

Il est inutile d'insister sur l'importance de la découverte des premiers foyers de Mildiou. Ils doivent être principalement recherchés dans les situations favorables au développement de la maladie, spécialement les bas-fonds humides où l'eau séjourne à la surface du sol.

Dans chaque département une prime de 50 Frs et de 30 Frs sera attribuée aux personnes qui auront découvert la première et la deuxième tache de Mildiou.

Les personnes qui auront trouvé ces taches devront les envoyer sous pli affranchi à la Station d'Avertissements Agricoles "CENTRE" 21, rue Eugène Vignat 45 - ORLEANS.

Pour que l'envoi arrive en bon état il est conseillé de placer les feuilles dans un peu de mousse ou de coton hydrophile humide ou dans un sac en matière plastique.

L'envoi devra être accompagné des renseignements suivants :

NOM : AGE DE LA VIGNE :
PRENOM : SITUATION DE LA FEUILLE SUR LA SOUCHE (1ère,
2ème, etc.) :
ADRESSE : SITUATION DU VIGNOBLE : (coteau
..... (plaine
..... (cuvette
LIEU DE DECOUVERTE DE LA TACHE DE MILDIOU : IMPORTANCE DE L'ATTAQUE (nombre de taches
découvertes) :
DATE : CEPAGE :

CONCOURS POUR LA DETECTION DES FOYERS PRIMAIRES

DE MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

Un concours est ouvert dans chacun des six départements de la Circonscription "CENTRE". Une prime de 50 Frs et de 30 Frs sera attribuée aux personnes qui auront découvert la première et la deuxième tache de Mildiou.

Afin que l'envoi nous parvienne en bon état de conservation, les feuilles devront être envoyées dans un peu de mousse ou de coton hydrophile légèrement humide. Il est déconseillé d'employer les sacs en matière plastique.

L'envoi devra être accompagné des renseignements suivants :

NOM : VARIETE ATTAQUEE :
PRENOM : IMPORTANCE DE L'ATTAQUE :
ADRESSE : TRAITEMENTS EFFECTUES :
DATE :

P 120